

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒			
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2 点滴注射		●	●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ポララミン注 5mg/1mL	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3 点滴注射		●		
	パージェタ注 （420mg/Body）	420mg			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 2コース目以降30分可。				
注射	4 点滴注射		●		
	トラスツズマブBS注 （6mg/kg）	6mg/kg			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 2コース目以降30分可。				
注射	5 点滴注射		●	●	●
	パクリタキセル注 （80mg/m ² ）	80mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射	6 点滴注射		●	●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射	7 静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用				