レジメン名称:B17-101 Brentuximab triweekly (BW>87) 休薬期間:21日

(不要の場合は削除)

分類 No. 薬剤/手技 投与量 day(1)注射 1 点滴注射 デキサート注 3.3 mg/1ml 6.6 m g 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 100 m L 点滴注射:1日1回 30 分で 注射 2 点滴注射 アドセトリス注 $1.8 \,\mathrm{m}\,\mathrm{g}/\mathrm{kg}$ (1.8 mg/kg)注射用蒸留水 100ml(PG) 1瓶 (1V/DW 10.5mLで溶解) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 250 m L 点滴注射:1日1回 (BW>100kgは、100kgで計算) 30 分で 注射 3 点滴注射 生理食塩液PL 5 0 m l 1瓶 点滴注射:1日1回 フラッシュ用 注射 4 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 1筒 ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 注射 5 静脈内注射(リザーバーより) 生食注シリンジ 20ml【要時】ロック付 1筒 ^パリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL(ペミロック) 1筒 ワンショット:1日1回