

レジメン名称：O15-201 G-SOX (130mg/m²) triweekly 休薬期間：21日

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	<p>静脈内注射</p> <p>生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付</p> <p>パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンNa)</p> <p>(不要の場合は削除)</p> <p>ワンショット：1日1回</p>	1筒 1筒	●
注射 2	<p>点滴注射</p> <p>デキサート注 3.3mg / 1ml</p> <p>アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>30分で</p>	6.6mg 1袋	●
注射 3	<p>点滴注射</p> <p>エルプラット注</p> <p>(130mg/m²)</p> <p>5%ブドウ糖注 250m l</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>120分で</p>	130mg/m ² 250mL	●
注射 4	<p>点滴注射</p> <p>生理食塩液 P L 50m l</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>フラッシュ用</p>	1瓶	●
注射 5	<p>静脈内注射</p> <p>生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付</p> <p>ワンショット：1日1回</p> <p>フラッシュ用</p> <p>(不要の場合は削除)</p>	1筒	●
内服	S-1	80mg/m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用