

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キイトルーダ）	100mL	●
注射 3	点滴注射 キイトルーダ注 （200mg/body） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で	200mg 100mL	●
注射 4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1袋	●
注射 5	点滴注射 アリムタ注射用 （500mg/m ² ） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 10分で アリムタ投与後、30分の経過観察不要	500mg/m ² 100mL	●
注射 6	点滴注射 カルボプラチン （AUC=5） 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 60分で アリムタ投与後、30分の経過観察不要	0mg/A 250mL	●
注射 7	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 8	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●