

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 90 分で		
注射 3	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射 4	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9m g	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 5	点滴側管注		●
	マンニトールS注 300m L/袋	300m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 6	点滴側管注		●
	シスプラチン注 (60mg/m ²)	60m g / m ²	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で		
注射 7	点滴側管注		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 8	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		
内服			
	S-1	80mg/m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用