

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNa0.75mg/100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		ボラミン注 5mg/1mL	1A			
		ガスター注 20mg	1A			
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
		30分で				
		点滴注射：1日1回				
注射	3	点滴注射		●		
		バクリタキセル注	80mg/m ²			
		(80mg/m ²)				
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		60分で				
注射	4	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0mg/A			
		(AUC=6)				
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		60分で				
注射	5	点滴注射		●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10分で				
注射	6	静脈内注射		●		
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
		フラッシュ用				
注射	7	点滴注射			●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		ガスター注 20mg	1A			
		ボラミン注 5mg/1mL	1A			
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	8	点滴注射			●	
		バクリタキセル注	80mg/m ²			
		(80mg/m ²)				
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		60分で				
注射	9	点滴注射			●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10分で				
注射	10	静脈内注射			●	
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
		フラッシュ用				
注射	11	点滴注射				●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		ガスター注 20mg	1A			
		ボラミン注 5mg/1mL	1A			
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	12	点滴注射				●
		バクリタキセル注	80mg/m ²			
		(80mg/m ²)				
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		60分で				
注射	13	点滴注射				●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10分で				
注射	14	静脈内注射				●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
		フラッシュ用				