

薬剤 No. 薬剤/手技		投与量	day(1)	day(4)	day(8)	day(11)	day(15)	day(22)	day(25)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）			●		●		●	
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】ロック付		1筒						
	ペリナドール用100単位/mLシリンジ 10mL（＜20mg）		1筒						
	ワンショット：1日1回								
注射 2	点滴注射			●		●		●	
	デキサート注 3、3 mg／1 m l		6A						
	ボタラミン注 5 mg／1 m l		1A						
	生食注（生理食塩液）100 m l（PG）		100m L						
	点滴注射：1日1回								
	30 分で								
注射 3	点滴注射			●		●		●	
	生食注（生理食塩液）100 m l（PG）		1瓶						
	点滴注射：1日1回								
30 分以上かけて									
注射 4	点滴注射			●					
	ダラザレックス注（16mg/kg）		16m g/kg						
	生理食塩液注 1 l		1000m L						
	点滴注射：1日1回								
	初回1時間は50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで、インラインフィルターを使用。								
注射 5	点滴注射			●					
	生理食塩液 P L 50 m l		1瓶						
	点滴注射：1日1回								
注射 6	皮下注射			●	●				
	ベルケイド注（1.3mg/ml）		1.3m g/ml						
	生理食塩液注 20 m l（1Vあたり1.2mLで溶解）		1.2m L						
	ワンショット：1日1回								
注射 7	静脈内注射			●					
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】ロック付		1筒						
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用								
注射 8	点滴注射				●				
	ダラザレックス注（16mg/kg）		16m g/kg						
	生理食塩液注 【生食】 500 m l		500m L						
	点滴注射：1日1回								
	最初1時間は50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで、インラインフィルターを使用。								
注射 9	点滴注射				●				
	生理食塩液 P L 50 m l		1瓶						
	点滴注射：1日1回								
注射 10	皮下注射				●	●			
	ベルケイド注（1.3mg/ml）		1.3m g/ml						
	生理食塩液注 20 m l（1Vあたり1.2mLで溶解）		1.2m L						
	ワンショット：1日1回								
注射 11	静脈内注射				●				
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】ロック付		1筒						
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用								
注射 12	点滴注射						●	●	
	ダラザレックス注（16mg/kg）		16m g/kg						
	生理食塩液注 【生食】 500 m l		500m L						
	点滴注射：1日1回								
	最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで、インラインフィルターを使用。								
注射 13	点滴注射						●	●	
	生理食塩液 P L 50 m l		1瓶						
	点滴注射：1日1回								
注射 14	静脈内注射						●	●	
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】ロック付		1筒						
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用								
注射 15	皮下注射							●	●
	ベルケイド注（1.3mg/ml）		1.3m g/ml						
	生理食塩液注 20 m l（1Vあたり1.2mLで溶解）		1.2m L						
	ワンショット：1日1回								
分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(29)	day(32)	day(36)				
注射 16	静脈内注射（リザーバーより）			●		●			
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】ロック付		1筒						
	ペリナドール用100単位/mLシリンジ 10mL（＜20mg）		1筒						
	ワンショット：1日1回								
注射 17	点滴注射			●		●			
	デキサート注 3、3 mg／1 m l		6A						
	ボタラミン注 5 mg／1 m l		1A						
	生食注（生理食塩液）100 m l（PG）		100m L						
	点滴注射：1日1回								
	30 分で								
注射 18	点滴注射			●		●			
	生食注（生理食塩液）100 m l（PG）		1瓶						
	点滴注射：1日1回								
30 分以上かけて									
注射 19	点滴注射			●		●			
	ダラザレックス注（16mg/kg）		16m g/kg						
	生理食塩液注 【生食】 500 m l		500m L						
	点滴注射：1日1回								
	最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで、インラインフィルターを使用。								
注射 20	点滴注射			●		●			
	生理食塩液 P L 50 m l		1瓶						
	点滴注射：1日1回								
注射 21	皮下注射			●	●				
	ベルケイド注（1.3mg/ml）		1.3m g/ml						
	生理食塩液注 20 m l（1Vあたり1.2mLで溶解）		1.2m L						
	ワンショット：1日1回								
注射 22	静脈内注射			●		●			
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】ロック付		1筒						
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用								
内服									
メルファラン		9mg/㎡ 分1 食後				day(1)～(4)服用			
内服									
ブレドニゾン		60mg/㎡ 分1 食後				day(2)～(4)服用			