

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3	点滴注射		●		
		シスプラチン注 (20~25mg/m ²)	25mg/m ²			
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	4	点滴注射		●		
		エトポシド注 (80-100mg/m ²)	100mg/m ²			
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	5	点滴注射		●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射	6	静脈内注射		●		
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				
注射	7	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		シスプラチン注 (20~25mg/m ²)	25mg/m ²			
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		エトポシド注 (80-100mg/m ²)	100mg/m ²			
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	10	点滴注射			●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射	11	静脈内注射			●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				