

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ﾊﾟｰｼｬNaClが用100単位/mLシリンジ 10mL(ﾊﾟｰｼｬｯｸ)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	ソルデム3A注 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 90分で			
注射 3	点滴注射		●	
	ヴィーン3G注 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 90分で			
注射 4	点滴注射		●	
	ヴィーン3G注 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射 5	点滴側管注		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 6	点滴注射		●	
	【要時】ポートラーザ注 (800mg/body)	800mg		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) (全量250mlに調製)	250mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射 7	点滴側管注		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 8	点滴注射		●	
	ジェムザール注 (1250mg/m2)	1250mg		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 9	点滴側管注		●	
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 10	点滴側管注		●	
	シスプラチン注 (75mg/m2)	75mg		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で			
注射 11	点滴側管注		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 12	静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射 13	点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 14	点滴注射			●
	【要時】ポートラーザ注 (800mg/body)	800mg		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) (全量250mlに調製)	250mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射 15	点滴注射			●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 16	点滴注射			●
	ジェムザール注 (1250mg/m2)	1250mg		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 17	点滴注射			●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 18	静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			