

レジメン名称：F17-301 Bev (5mg/kg) /FOLFIRI biweekly

休薬期間：14日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		リザーバーフラッシュ用		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射（リザーバーより）		●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg	
		アロキン注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	3	点滴注射(リザーバーより)		●
		アバスチン注	5mg/kg	
		(5mg/kg)		
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	4	点滴注射（リザーバーより）		●
		レボホリナート注	200mg/m ²	
		(200mg/m ²)		
		生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		120分で		
注射	5	点滴注射(リザーバーより)		●
		カンプト注	150mg/m ²	
		(150-180mg/m ²)		
		生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		レボホリナートと同時に側管から投与		
		90分で		
注射	6	点滴注射(リザーバーより)		●
		5-FU注	400mg/m ²	
		(400mg/m ²)		
		生理食塩液PL 50m l	50mL	
		点滴注射：1日1回		
		レボホリナート終了後全開		
		4分で		
注射	7	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		
注射	8	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
		フラッシュ用		
注射	9	点滴注射(リザーバーより)		●
		5-FU注	2400mg/m ²	
		(2400mg/m ²)		
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	1瓶	
		（全量140m lに調製）		
		点滴注射：1日1回		
		type_T（青色タイプで持ち帰り）		
		46時間で		