

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	持続点滴		●
	ソルデム3 A注 500m l	500m L	
	★ 20m l メイロン84注	1A	
	持続点滴：1日1回 メイン 360分で		
注射 2	点滴注射		●
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A	
	生理食塩液PL 50ml	50m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 3	点滴注射		●
	ガザイバ注 (1000mg/body)	1000m g	
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) (全量250ml に調製) インラインフィルター使用	250m L	
	点滴注射：1日1回 初回12.5mL/hで開始。30分毎に12.5mL/hずつ上げ 100mL/hまで。2回目以降30mL/hで開始。30 分毎に25mL/hずつ上げ100mL/hまで。2サイクル以降、 最初の30分は30mL/h。その後225mL/hで投与可。 初回4.5h。2回目以降3.5h。2サイクル以降2h。		
注射 4	点滴注射		●
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	アドリアシン注 (50mg/m <sup>2</sup> )	50mg / m <sup>2</sup>	
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 6	点滴注射		●
	オンコピン注 (1.4mg/m <sup>2</sup> 、最大2mg/B)	1.4mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液PL 50ml	50m L	
	点滴注射：1日1回 全開。		
注射 7	点滴注射		●
	エンドキサン注 (750mg/m <sup>2</sup> )	750mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 90 分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 9	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNa <sup>0</sup> 用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 10	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
内服			
	プレドニゾロン	60mg / m <sup>2</sup> 分1 食後	day(1)~(5)服用