

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射 2	点滴側管注 生理食塩液P L 50m l 点滴注射：1日1回 （プライミング用）	1瓶	●
注射 3	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で	150mg 100m L	●
注射 4	点滴側管注 アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L デキサート注 3.3mg / 1m l 点滴注射：1日1回 15分で	1袋 9.9mg	●
注射 5	点滴側管注 トラスツズマブBS注 （初回のみ8mg/kg） 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：90分	8mg / kg 250m L	●
注射 6	点滴側管注 マンニトールS注 300m L / 袋 点滴注射：1日1回 30分で	300m L	●
注射 7	点滴側管注 シスプラチン注 （80mg/m ² ） 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	80mg / m ² 250m L	●
注射 8	点滴注射 ソルデム3A注 500m l 点滴注射：1日1回 2時間で	500m L	●
注射 9	点滴注射 ヴィーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 2時間で	500m L	●
注射 10	点滴注射 ヴィーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 60分で	500m L	●
注射 11	点滴側管注 生理食塩液P L 50m l 点滴注射：1日1回 （フラッシュ用）	1瓶	●
注射 12	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●
内服	カベシタピン	2000mg / m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用