

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 へリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へリンロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴側管注 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 (プライミング用)	1瓶	●
注射 3	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注 (生理食塩液) 100m l (P G) 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30 分で	150mg 100m L	●
注射 4	点滴側管注 アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL デキサート注 3.3mg / 1m l 点滴注射：1日1回 15 分で	1袋 9.9mg	●
注射 5	点滴側管注 トラスツズマブ B S注 (6mg/kg) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。	6mg /kg 250m L	●
注射 6	点滴側管注 マニトール S注 300m L /袋 点滴注射：1日1回 30 分で	300m L	●
注射 7	点滴側管注 シスプラチン注 (80mg/m ²) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で	80mg /m ² 250m L	●
注射 8	点滴注射 ソルデム3A注 500m l 点滴注射：1日1回 2 時間で	500m L	●
注射 9	点滴注射 ヴィーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 60 分で	500m L	●
注射 10	点滴側管注 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)	1瓶	●
注射 11	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●
内服	カペシタピン	2000mg/m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用