

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 ライン確保及びフラッシュ用(キトルダ)			
注射	3	点滴注射		●	
		キトルダ注 (200mg/body)	200mg		
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用、単独投与 30分で			
注射	4	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		ポララミン注 5mg/1mL	1A		
		ガスター注 20mg	1A		
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	5	点滴注射		●	●
		パクリタキセル注 (90mg/m ²)	90mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射	6	点滴注射		●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	7	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			