

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒	
	ﾊﾟﾘﾝNaﾓｯｸ用100単位/mLシリンジ 10mL(ﾊﾟﾘﾝﾓｯｸ)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴側管注		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保用		
注射 3	点滴注射		●
	オプジーボ注 (360mg/Body)	360mg	
	生理食塩液 P L 50m l	50m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 単独投与、ソルデムと併用しない 30分で		
注射 4	点滴側管注		●
	生食注(生理食塩液) 100m l (P G)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 投与間隔30分確保用 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500m l	1袋	
	点滴注射：1日1回 オプジーボ終了後投与開始 90分で		
注射 6	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射 7	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 8	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg/1m l	9.9mg	
	アロキン注バッグ 0.75mg/50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 9	点滴側管注		●
	アリムタ注射用 (500mg/m ²)	500mg/m ²	
	生食注(生理食塩液) 100m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1日1回 オプジーボ投与後30分あけて 10分で		
注射 10	点滴側管注		●
	マンニトールS注 300m L/袋	300m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 11	点滴側管注		●
	シスプラチン注 (75mg/m ²)	75mg/m ²	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 12	点滴側管注		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 13	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		