

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	2 静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	3 点滴注射		●	●
	デキサート注 3. 3mg / 1ml	6.6mg		
	生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	4 点滴注射		●	●
	メソトレキセート注	40mg / m <sup>2</sup>		
	生理食塩液 PL 50ml (40mg/m <sup>2</sup> )	50mL		
	点滴注射：1日1回 15分で			
注射	5 点滴注射		●	●
	5-FU注	600mg / m <sup>2</sup>		
	生理食塩液 PL 50ml (600mg/m <sup>2</sup> )	50mL		
	点滴注射：1日1回 15分で			
注射	6 点滴注射		●	●
	生理食塩液 PL 50ml	50mL		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	7 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			
内服				
	シクロホスファミド	100-150mg/日 分1 食後		day(1)~(14)服用