

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ベリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ベミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		(不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		ソルデム3A注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		90分で			
注射	3	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		60分で			
注射	4	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		60分かけて			
注射	5	点滴側管注		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	6	点滴側管注		●	
		ナベルピン注	25mg/m ²		
		(20-25mg/m ²)			
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回			
		全開で			
注射	7	点滴側管注		●	
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	8	点滴側管注		●	
		シスプラチン注	80mg/m ²		
		(60-80mg/m ²)			
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回			
		ソルデム1本終了後			
		60分で			
注射	9	点滴側管注		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回			
		フラッシュ用			
注射	10	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		フラッシュ用			
		(不要の場合は削除)			
注射	11	点滴注射			●
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回			
		ルート確保用、フラッシュ用			
注射	12	点滴側管注			●
		ナベルピン注	25mg/m ²		
		(20-25mg/m ²)			
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回			
		全開で			
注射	13	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		フラッシュ用			
		(不要の場合は削除)			