レジメン名称：P16-301 Bev/PTX/CBDCA triweekly（卵巣癌）　　休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒	
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 10mL(ﾍﾟﾐﾛｯｸ)	1筒	
		ワンショット：１日１回		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		ポララミン注　５ｍｇ／１ｍｌ	1A	
		ガスター注　２０ｍｇ	1A	
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	16.5ｍｇ	
		アロキシ注バッグ　０.７５ｍｇ／５０mL	1袋	
		点滴注射：１日１回		
		３０　分で		
注射	3	点滴注射		●
		アバスチン注	15ｍｇ/kg	
		（15mg/kg）		
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍL	
		点滴注射：１日１回		
		30　分で		
注射	4	点滴注射		●
		パクリタキセル注	175ｍｇ/㎡	
		（175mg/㎡）		
		生理食塩液注【生食】　５００ｍｌ	500ｍL	
		点滴注射：１日１回		
		インラインフィルターを使用		
		180分で		
注射	5	点滴注射		●
		カルボプラチン	0ｍｇ/A	
		（AUC=6）		
		５％ブドウ糖注　２５０ｍｌ	250ｍL	
		点滴注射：１日１回		
		60　分で		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶	
		点滴注射：１日１回		
		フラッシュ用		
注射	7	静脈内注射		●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット：１日１回		
		（不要の場合は削除）		
		フラッシュ用		