

レジメン名称：A15-201 Abraxane (d1,8,15)/CBDCA triweekly

休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		（不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3. 3mg / 1m l	6.6mg			
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	3	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		アブラキサン投与前後フラッシュ用				
注射	4	点滴注射		●		
		アブラキサン注	100mg / m ²			
		（100mg/m ² ）				
		生理食塩液 P L 50m l	50m L			
		（1バialあたり20mLで溶解）				
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルター不可				
		30 分で				
注射	5	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0mg / A			
		（AUC=6）				
		5 %ブドウ糖注 250m l	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		60 分で				
注射	6	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10 分で				
注射	7	静脈内注射		●		
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		（不要の場合は削除）				
		フラッシュ用				
注射	8	点滴注射			●	●
		デキサート注 3. 3mg / 1m l	6.6mg			
		生食注（生理食塩液）100m l （P G）	100m L			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		アブラキサン投与前後フラッシュ用				
注射	10	点滴注射			●	●
		アブラキサン注	100mg / m ²			
		（100mg/m ² ）				
		生理食塩液 P L 50m l	50m L			
		（1バialあたり20mLで溶解）				
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルター不可				
		30 分で				
注射	11	静脈内注射			●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		（不要の場合は削除）				
		フラッシュ用				