

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2 点滴注射		●	●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	10A		
	ポララミン注 5mg / 1m l	1A		
	ガスター注 20mg	1A		
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3 点滴注射		●	●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L		
	点滴注射：1日1回 30分以上かけて			
注射	4 点滴注射		●	●
	サークリサ注 (10mg/kg)	10mg/kg		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 【全量250mLに調製】	250m L		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用。 最初60分;40mL/h 次30分;60mL/h、次30分;90mL/h、以降;100mL/h。			
注射	5 点滴注射		●	●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	6 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
内服				
	ポマリドミド	4mg/日 分1 食後		day(1)~(21)服用
内服				
	レナデックス	40mg/日 分1 食後		day(8)(22)服用