

レジメン名称：CPT15-201 CPT-11(d1,8)/CDGP monthly 休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミンロック)	1筒		
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	●
		カンプト注	60mg/m ²		
		(50-60mg/m ²)			
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	4	点滴注射		●	
		アクブラ注	80mg/m ²		
		生理食塩液注 【生食】 500mL	500mL		
		(70-80mg/m ²)			
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	5	点滴注射		●	
		生理食塩液注 【生食】 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	6	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
		フラッシュ用			
注射	7	点滴注射			●
		生理食塩液 PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 10分で フラッシュ用			