

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(8)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		(不要の場合は削除)		
注射	2	点滴側管注		●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		(プライミング用)		
注射	3	点滴側管注		●
		プロイメンド注 150m g	150m g	
		生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	100m L	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム 3 Aと同時に側管から		
		30 分で		
注射	4	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3m g / 1m l	9.9m g	
		アロキシ注バッグ 0.75m g / 50m L	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		15 分で		
注射	5	点滴側管注		●
		マンニトール S 注 300m L / 袋	300m L	
		点滴注射：1日1回		
		30 分で		
注射	6	点滴側管注		●
		シスプラチン注	60m g / m ²	
		(40-80mg/m ²)		
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム1本終了後		
		60 分で		
注射	7	点滴側管注		●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		
注射	8	点滴注射		●
		ソルデム 3 A 注 500m l	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		90 分で		
注射	9	点滴注射		●
		ヴィーン 3 G 注 500m L	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		60 分で		
注射	10	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		(不要の場合は削除)		
		フラッシュ用		
内服				
		S-1	80mg/m ²	day(1)～(21)服用
			分2 食後	