

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ヘパリンNaコック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミンコック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 ソルデム3A注 500m l 点滴注射：1日1回 90分で	500m L	●
注射 3	点滴注射 ヴィーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 60分で	500m L	●
注射 4	点滴注射 ヴィーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 60分かけて	500m L	●
注射 5	点滴側管注 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 ルート確保用	1瓶	●
注射 6	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注(生理食塩液)100m l (PG) 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で	150mg 100m L	●
注射 7	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1m l アロキソ注バッグ 0.75mg/50m L 点滴注射：1日1回 15分で	9.9mg 1袋	●
注射 8	点滴側管注 マンニトールS注 300m L/袋 点滴注射：1日1回 30分で	300m L	●
注射 9	点滴側管注 シスプラチン注 (80mg/m ²) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	80mg/m ² 250m L	●
注射 10	点滴側管注 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 11	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●
注射 12	持続点滴 5-FU注 (4000mg/m ² /120時間) 生食注(生理食塩液)100m l (PG) (全量230mLに調製) 持続点滴：1日1回 インジェクターLV2(黄色タイプ)使用 120時間で	4000mg/m ² 2瓶	●