

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用		
	(不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3. 3mg / 1ml	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回		
	30分で		
注射 3	点滴注射		●
	ベクティピックス点滴静注	6mg/kg	
	(6mg/kg)		
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回		
	インラインフィルターを使用		
	60分で		
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回		
	15分で		
注射 5	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注	200mg/m <sup>2</sup>	
	(200mg/m <sup>2</sup> )		
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回		
	120分で		
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●
	カンプト注	150mg/m <sup>2</sup>	
	(150-180mg/m <sup>2</sup> )		
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回		
	レボホリナートと同時に側管から投与		
	90分で		
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注	400mg/m <sup>2</sup>	
	(400mg/m <sup>2</sup> )		
	生理食塩液PL 50ml	50mL	
	点滴注射：1日1回		
	レボホリナート終了後全開		
	4分で		
注射 8	点滴注射（リザーバーより）		●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶	
	点滴注射：1日1回		
	フラッシュ用		
注射 9	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	フラッシュ用		
	(不要の場合は削除)		
注射 10	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注	2400mg/m <sup>2</sup>	
	(2400mg/m <sup>2</sup> )		
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	1瓶	
	(全量140mlに調製)		
	点滴注射：1日1回		
	type_T (青色タイプで持ち帰り)		
	46時間で		