

| 分類 No. | 薬剤/手技                                                                                                            | 投与量                            | day(1) | day(8)       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|
| 注射 1   | 静脈内注射（リザーバーより）<br>生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付<br>ヘパリンNaコック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパリンコック）<br>ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除） | 1筒<br>1筒                       | ●      | ●            |
| 注射 2   | 点滴注射<br>ソルデム3A注 500mL<br>点滴注射：1日1回<br>メイン<br>3時間で                                                                | 500mL                          | ●      |              |
| 注射 3   | 点滴注射<br>水性ブレドニン注<br>アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL<br>点滴注射：1日1回<br>30分で                                                    | 100mg<br>1袋                    | ●      |              |
| 注射 4   | 点滴注射<br>ジェムザール注<br>（1000mg/m <sup>2</sup> ）<br>5%ブドウ糖注 100mL<br>点滴注射：1日1回<br>30分で                                | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | ●      |              |
| 注射 5   | 点滴注射<br>オンコビン注<br>（1.4g/m <sup>2</sup> 、最大2mg/B）<br>生理食塩液PL 50mL<br>点滴注射：1日1回<br>適宜。<br>全開。                      | 1.4g/m <sup>2</sup><br>50mL    | ●      |              |
| 注射 6   | 点滴注射<br>エンドキサン注<br>（750g/m <sup>2</sup> ）<br>生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）<br>点滴注射：1日1回<br>90分で                           | 750g/m <sup>2</sup><br>250mL   | ●      |              |
| 注射 7   | 点滴注射<br>生理食塩液PL 50mL<br>点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                                                                      | 1瓶                             | ●      |              |
| 注射 8   | 静脈内注射<br>生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付<br>ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）<br>フラッシュ用                                             | 1筒                             | ●      |              |
| 注射 9   | 点滴注射<br>デキサート注 3.3mg/1mL<br>生食注（生理食塩液）100mL（PG）<br>点滴注射：1日1回<br>30分で                                             | 6.6mg<br>100mL                 |        | ●            |
| 注射 10  | 点滴注射<br>ジェムザール注<br>（1000mg/m <sup>2</sup> ）<br>5%ブドウ糖注 100mL<br>点滴注射：1日1回<br>30分で                                | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL |        | ●            |
| 注射 11  | 点滴注射<br>生理食塩液PL 50mL<br>点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                                                                      | 1瓶                             |        | ●            |
| 注射 12  | 静脈内注射<br>生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付<br>ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）<br>フラッシュ用                                             | 1筒                             |        | ●            |
| 内服     | ブレドニゾン                                                                                                           | 100mg/日<br>分1食後                |        | day(2)～(5)服用 |