

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNa付用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン)	1筒	
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射: 1日1回 ライン確保用		
注射 3	点滴注射		●
	オブジーボ注 (360mg/Body)	360mg	
	生理食塩液 P L 50m l	50m L	
	点滴注射: 1日1回 インラインフィルターを使用 30分で		
注射 4	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	1瓶	
	点滴注射: 1日1回 投与間隔30分確保用 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	ヤーボイ注 (1mg/kg)	1mg/kg	
	生理食塩液 P L 50m l (全量30mLに調製)	30m L	
	点滴注射: 1日1回 インラインフィルターを使用 オブジーボ 投与後30分あけて 30分で		
注射 6	点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1m l	16.5mg	
	ポララミン注 5mg/1m l	1A	
	ガスター注 20mg	1A	
	アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射: 1日1回 30分で		
注射 7	点滴注射		●
	パクリタキセル注 (200mg/m ²)	200mg/m ²	
	生理食塩液注【生食】 500m l	500m L	
	点滴注射: 1日1回 ヤーボイ投与後30分あけて インラインフィルターを使用 180分で		
注射 8	点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=6)	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L	
	点滴注射: 1日1回 60分で		
注射 9	点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用 10分で		
注射 10	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット: 1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		