

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパロック） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射	2	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管投与 30分で	150mg 100mL	●
注射	3	点滴側管注 デキサート注 3.3mg / 1mL アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 15分で	9.9mg 1袋	●
注射	4	点滴側管注 シスプラチン注 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （30-40mg/m ² ） 点滴注射：1日1回 下記投与量より低用量で開始する場合あり ソルデム1本終了後 60分で	40mg / m ² 250mL	●
注射	5	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射	6	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン 60分で	500mL	●
注射	7	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 メイン 2時間で	500mL	●
注射	8	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●