

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合削除)		
注射 2	点滴注射 (リザーバーより)		●
	プロイメンド注 150mg	150mg	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
	30分で 点滴注射：1日1回		
注射 3	点滴注射 (リザーバーより)		●
	デキサート注 3.3mg / 1mL	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射 4	点滴注射(リザーバーより)		●
	トラスツズマブBS注 (4mg/kg)	4mg/kg	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 2回目以降 30分可		
注射 5	点滴注射 (リザーバーより)		●
	レボホリナート注 (200mg/m ²)	200mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 120分で		
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●
	エルブラット注 (85mg/m ²)	85mg/m ²	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で		
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (400mg/m ²)	400mg/m ²	
	生理食塩液PL 50mL	50mL	
	点滴注射：1日1回 4分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。		
注射 9	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合削除) フラッシュ用		
注射 10	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (2400mg/m ²)	2400mg/m ²	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) (全量140mLに調製)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で		