

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用		
	（不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回		
	30分で		
注射	3 点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注	200mg/m ²	
	（200mg/m ² ）		
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回		
	120分で		
注射	4 点滴注射（リザーバーより）		●
	カンプト注	150mg/m ²	
	（150-180mg/m ² ）		
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回		
	レボホリナートと同時に側管から投与		
	90分で		
注射	5 点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注	400mg/m ²	
	（400mg/m ² ）		
	生理食塩液PL 50mL	50mL	
	点滴注射：1日1回		
	レボホリナート終了後全開		
	4分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回		
	フラッシュ用		
注射	7 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	フラッシュ用		
	（不要の場合は削除）		
注射	8 点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注	2400mg/m ²	
	（2400mg/m ² ）		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	（全量140mLに調製）		
	点滴注射：1日1回		
	type_T（青色タイプで持ち帰り）		
	46時間で		