

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射	2	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック）	1筒						
		ワンショット：1日1回							
		不要の場合は削除可							
注射	3	点滴注射		●	●	●	●	●	●
		デキサート注 3.3mg／1ml	6A						
		生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	4	点滴注射		●	●	●	●	●	●
		カイプロリス注	56mg/m ²						
		（56mg/m ² ）							
		★全量250mLに調製★							
		注射用蒸留水 100ml（PG）	1瓶						
		（カイプロリス溶解用）							
		5%ブドウ糖注 250ml	250mL						
注射	5	点滴注射		●	●	●	●	●	●
		生理食塩液PL 50ml	1瓶						
		点滴注射：1日1回							
		フラッシュ用							
注射	6	皮下注射		●					
		ダラキューロ配合皮下注	1800mg						
		（1800mg/body）							
		ワンショット：1日1回							
		時計回りに腹部皮下組織に投与							
		3～5分で							
（カイプロリス投与後）									
内服									
		レナデックス	40mg/日 分1 食後		day(22)服用				