

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2	点滴注射		●
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 ライン確保用		
注射	3	点滴注射		●
		オブジーボ注 (360mg/Body)	360mg	
		生理食塩液 PL 50mL	50mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で		
注射	4	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回 投与間隔30分確保用 30分で		
注射	5	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	6	点滴注射		●
		アリムタ注射用 (500mg/m ²)	500mg/m ²	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回 オブジーボ投与後30分あけて 10分で		
注射	7	点滴注射		●
		カルボプラチン (AUC=5-6)	0mg/A	
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
		点滴注射：1日1回 60分で		
注射	8	点滴注射		●
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		
注射	9	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		