

| 分類 No. | 薬剤/手技   | 投与量                           | day(1) | day(4) | day(8) | day(11)                      |
|--------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| 注射 1   | 静脈内注射（リザーバーより）<br>生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付<br>へリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（へリンロック）<br>ワンショット：1日1回  | 1筒<br>1筒                      | ●      |        |        |                              |
| 注射 2   | 点滴注射<br>デキサート注 3.3mg/1mL<br>ポララミン注 5mg/1mL<br>生食注（生理食塩液）100mL（PG）<br>点滴注射：1日1回<br>30分で  | 6A<br>1A<br>100mL             | ●      |        |        |                              |
| 注射 3   | 点滴注射<br>生食注（生理食塩液）100mL（PG）<br>点滴注射：1日1回<br>30分以上かけて  | 1瓶                            | ●      |        |        |                              |
| 注射 4   | 点滴注射<br>ダラザレックス注<br>（16mg/kg）<br>生理食塩液注【生食】 500mL<br>点滴注射：1日1回<br>最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に<br>50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。<br>インラインフィルターを使用。 | 16mg/kg<br>500mL              | ●      |        |        |                              |
| 注射 5   | 点滴注射<br>生理食塩液PL 50mL<br>点滴注射：1日1回   | 1瓶                            | ●      |        |        |                              |
| 注射 6   | 皮下注射<br>ベルケイド注<br>（1.3mg/m <sup>2</sup> ）<br>生理食塩液注 20mL<br>（1Vあたり1.2mLで溶解）<br>ワンショット：1日1回<br>Daratumumab投与後                        | 1.3mg/m <sup>2</sup><br>1.2mL | ●      |        |        |                              |
| 注射 7   | 静脈内注射<br>生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付<br>ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）<br>フラッシュ用   | 1筒                            | ●      |        |        |                              |
| 注射 8   | 皮下注射<br>ベルケイド注<br>（1.3mg/m <sup>2</sup> ）<br>生理食塩液注 20mL<br>（1Vあたり1.2mLで溶解）<br>ワンショット：1日1回  | 1.3mg/m <sup>2</sup><br>1.2mL |        | ●      | ●      | ●                            |
| 内服     | レナデックス  | 20mg/日<br>分1食後                |        |        |        | day(2)(4)(5)(8)(9)(11)(12)服用 |