

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2 点滴注射		●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	2A		
	ポララミン注 5mg/1mL	1A		
	ガスター注 20mg	1A		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 エムプリシティ投与の3-24時間前にデカドロ ン錠の内服を確認。 30分で			
注射	3 点滴注射		●	●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 45分以上かけて			
注射	4 点滴注射		●	●
	【要時】 エムプリシティ注 (10mg/kg)	10mg/kg		
	注射用蒸留水 100mL（PG） (エムプリシティ溶解用)	1瓶		
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 2コース目以降、120mL/h。			
注射	5 点滴注射		●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で			
注射	6 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			
内服				
	レナリドミド	25mg/日 分1 食後		day(1)~(21)服用
内服				
	レナデックス	28mg/日 分1 食後		day(1)(15)服用
内服				
	レナデックス	40mg/日 分1 食後		day(8)(22)服用