

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射		●
	パージェタ注	840mg	
	(初回のみ840mg/Body)		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	初回60分 点滴注射：1日1回		
注射 4	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
	30分で 点滴注射：1日1回		
注射 5	点滴注射		●
	トラスツズマブBS注	8mg/kg	
	(初回のみ8mg/kg)		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 初回90分。		
注射 6	点滴注射		●
	ドセタキセル注	75mg/m ²	
	(75mg/m ²)		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 1時間で		
注射 7	点滴注射		●
	カルボプラチン	0mg/A	
	(AUC=6)		
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で		
注射 9	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		