

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100 mL (PG)	100m L	
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6m g	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射 3	点滴注射		●
	トラスツズマブBS注 (初回のみ8mg/kg)	8m g /kg	
	生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 初回：90分。		
注射 4	点滴注射		●
	ドセタキセル注 (70mg/m ²)	70m g /m ²	
	生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射 5	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で		
注射 6	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		