

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射 1	静脈内注射		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ハパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ハパミン)	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)					
注射 2	点滴注射		●	●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	10A				
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A				
	ガスター注 20mg	1A				
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 3	点滴注射		●	●	●	●
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG)	100mL				
	点滴注射：1日1回 30分以上かけて					
注射 4	点滴注射		●	●	●	●
	サークリサ注 (10mg/kg)	10mg/kg				
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 【全量250mLに調製】	250mL				
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用。 初回：最初60分;40mL/h。 以降、30分毎に10mL/hずつ上げ90mL/hまで。 2回目以降、最初60分;40mL/h 次30分;60mL/h、次30分;90mL/h、以降;100ml/hまで。					
注射 5	点滴注射		●	●	●	●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用					
注射 6	静脈内注射		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用					
内服						
	ポマリドミド	4mg/日 分1 食後		day(1)～(21)服用		