

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●	●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ポララミン注 5mg/1mL	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴注射		●		
	パージェタ注	840mg			
	(初回のみ840mg/body)				
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 初回：60分。				
注射 4	点滴注射		●		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 5	点滴注射		●		
	トラスツズマブBS注	8mg/kg			
	(初回のみ8mg/kg)				
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 初回：90分。				
注射 6	点滴注射		●	●	●
	パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>			
	(80mg/m <sup>2</sup> )				
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 7	点滴注射		●	●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 8	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)				