

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	静脈内注射		●	●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL (ヘパミンロック)	1筒				
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)					
注射	2	点滴注射		●	●	●	●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	10A				
		ボララミン注 5mg / 1m l	1A				
		ガスター注 20mg	1A				
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L				
		点滴注射：1日1回 30分で					
注射	3	点滴注射		●	●	●	●
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L				
		点滴注射：1日1回 45分以上かけて					
注射	4	点滴注射		●	●	●	●
		【要時】 エムプリシティ注 (10mg/kg)	10mg g /kg				
		注射用蒸留水 100m l (PG) (エムプリシティ溶解用)	1瓶				
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L				
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用。初回:最初30分;30mL/h、 次30分;60mL/h、以降;120mL/h。 2回目:最初30分;180mL/h、以降;240mL/h。 3回目以降;300mL/h					
注射	5	点滴注射		●	●	●	●
		生理食塩液 PL 50m l	1瓶				
		フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で					
注射	6	静脈内注射		●	●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用					
内服							
		ポマリドミド	4mg/日 分1 食後		day(1)~(21)服用		