分類 No. 3					day(15)	
注射 1 青	争脈内注射 パリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL(ベミロック)	1筒		•	•	•
	E食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1筒				
	7ンショット:1日1回					
	(不要の場合は削除)					
注射 2点	R.満圧射 E食注(生理食塩液)100ml(PG)	100 m L				
	▼ 20ml メイロン84注	20m L				
	滴注射:1日1回					
Á	- 後開始					
	30 分で	-				
	原滴注射	20)			
	(ソトレキセート注 (30mg/㎡)	30m g /m²				
	(SUMB/M) E理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250m L				
	京滴注射: 1日1回					
4	-後開始					
	20分で					
	高注射		•			
	E理食塩液PL 50ml 泵滴注射:1日1回	1瓶				
	アラッシュ用					
	争脈內注射)			
4	E食注シリンジ 20ml【要時】ロック付	1筒				
	7ンショット:1日1回					
	(不要の場合は削除)					
	7 ラッシュ用			•		
	パルデム3A注 500ml	500m L				
	原滴注射:1日1回	0001112				
	90 分で					
注射 7点	高注射	_		•		
	プィーン 3 G注 5 0 0 m L	500 m L				
	京滴注射:1日1回					
	0 分で			•		
	高側管注プロイメンド注 150mg	150m g		•		
	1	100 m L				
	原海注射:1日1回					
	/ルデム 3 Aと同時に側管投与					
注射 9点				•		
	デキサート注 3. 3mg/1ml	9.9m g				
	プロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋				
	気滴注射:1日1回 ↓5 分で					
注射 10 点				•		
	こクザール注	3mg/m²				
	(3m g/m2)					
4	E理食塩液 P L 5 0 m l	50m L				
pl.	高流注射:1日1回					
# 	原滴注射:1日1回 e開			•		
点 全 注射 11 点	京滴注射: 1日 1 回 e開 京滴側管注	30m g /m²		•		
点 注射 11 点 7	表演注射:1日1回 開 高側管注 アドリアシン注	30m g /m²		•		
A 注射 11 点 7	京滴注射: 1日 1 回 e開 京滴側管注	30m g /m²		•		_
注射 11 点 2 2 3	表演注射: 1日1回 開 高 高級飼管注 ドリアシン注 (30mg/m2)			•		
A 全 注射 11 点 5 5 4 4 4	「関 「関 「リアシン注 (30mg/m2) 環身塩液 PL 50ml 満済注射:1日1回 に関する 10ml			•		
注射 11 点 注射 20 点 注射 12 点	議済注射: 1日1回 開 高級飼管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理身塩液アL 50ml 議済注射: 1日1回 開 議補開	50m L		•		
注射 11 点 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	限 関 関 でドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 P L 50ml 高注射: 1日1回 と問 高補間注 アンニットール S注 300mL/袋					
注射 11 点 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	限 関 変 変 が が が が が が が が が が が が が	50m L				
注射 11 点 5 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	議議注射:1日1回 開 (議画制管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 PL 50ml (液滴注射:1日1回 開 (液調管注 アンニットールS注 300mL/袋 (液滴注射:1日1回 (100 分で	50m L				
注射	議議注射:1日1回 開 (議画制管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 PL 50ml (液滴注射:1日1回 開 (液調管注 アンニットールS注 300mL/袋 (液滴注射:1日1回 (100 分で	50m L		•		
注射	限 (現在) (元本) (元本) (元本) (元本) (元本) (元本) (元本) (元本	50m L 300m L 70m g/m		•	_	
点 注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 13 点	議論注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理度塩液 PL 50ml 流滴注射:1日1回 開 高滴注射:1日1回 (30m 2/m2) に開 高滴注射:1日1回 (30分で 流滴性注 (70mg/m1) に理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	50 m L		•	_	_
注射 11 点	議済注射:1日1回 開 減減回管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理費塩液PL 50ml 減減回管注 アンニットールS注 300mL/袋 減減注射:1日1回 30 分で 減減回管注 スプラチン注 (70mg/m) 理費塩液注 250ml (ソフトバッグ) 玻璃注射:1日1回	50m L 300m L 70m g/m		•		
# 注射 11 # 7 7 2 4 # 12 # 12 # 13 # 13 # 13 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 # 2 #	環滴注射:1日1回 開 環流側管注 アドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 P L 50ml 販滴注射:1日1回 開 湯滴開管注 アンニットールS注 300mL/袋 添流注射:1日1回 30 分で 高滴側管注 レスプラチン注 (70mg/m) 注理的g/m/) 注述放注 250ml (ソフトバッグ) 流流注射:1日1回	50m L 300m L 70m g/m	_	•		_
注射 11 点	議論注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 添剤管注 アンニットールS注 300mL/袋 添流注射:1日1回 80 分で ※高剛管注 アンニットラールS注 300mL/袋 であった。 でのでは、 でのでのでのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでのでのでのでのでのでのでは、 でのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでの	50m L 300m L 70m g/m		•		
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 14 点	議議注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 環滴注射:1日1回 開 (高額管注 アンニットールS注 300mL/袋 電流注射:1日1回 (30分で 高落側管注 アスプラチン注 (70mg/m) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 活滴注射:1日1回 ルゲム1本終了後 0分で 0分で 0分で	50m L 300m L 70m g/m		•		
注射	議論注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 添剤管注 アンニットールS注 300mL/袋 添流注射:1日1回 80 分で ※高剛管注 アンニットラールS注 300mL/袋 であった。 でのでは、 でのでのでのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでは、 でのでのでのでのでのでのでのでは、 でのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでの	50m L 300m L 70m g /m 250m L		•	_	
注射	議論注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 流流注射:1日1回 開 (高高注射:1日1回 80 分で 流海側管注 // (70mg/m) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 流流計:1日1回 0 分で 流海側管注 // (70mg/m) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 流流計:1日1回 // (70mg/m) 生理食塩液注 1日1回 // (70mg/m) 生理食塩液注 1日1回 // (70mg/m) 生理食塩液注 1日1回 // (70mg/m) 生理食塩液注 1日1回 // (70mg/m) 生理食塩液注 1日1回 // (70mg/m)	50m L 300m L 70m g /m 250m L		•		
注射 11 / 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 ·	議論注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理度塩液PL 50ml 環滴注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 限間 (30mg/m2) に関いて、	50m L 300m L 70m g /㎡ 250m L		•	_	
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 点 13 点 注射 14 点 点 14 点 注射 14 点 注射 15 青 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 6 8 6 9 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 11 6 12 7 13 8 14 15 15 16 15 16 16 16 17 16 18 16 18 16 18 16 18 16 1	議演注射:1日1回 開 議画的管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理貴塩液PL 50ml 表演注射:1日1回 開 表演注射:1日1回 300mL/袋 表演注射:1日1回 300mL/袋 表演注射:1日1回 30分で 表演注射:1日1回 ルデム1本終了後 0かで 直理食塩液 PL 50ml (ソフトバッグ) 表演注射:1日1回 ルデム1本終了後 0かで 直理食塩液 PL 50ml (フトバッグ) 表演注射:1日1回 アンニットルの注 を関生を表示されている。 10元の音楽を表示されている。	50m L 300m L 70m g /m 250m L		•		
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 14 点 注射 15 青 注射 15 青 注射 15 青 15 音 0 16 音 0 17 日 0 18 日 0 17 日 0 18	議論注射:1日1回 開 高側管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 呈理食塩液PL 50ml 添剤管注 アンニットールS注 300mL/袋 添流注射:1日1回 30 分で 添加管注 (70mg/m) 理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 気流注射:1日1回 ロルデムは本終了後 0 分で 添剛管注 里食塩液注 PS 0ml (ソフトバッグ) 気流注射:1日1回 ロルデムは本終了後 0 分で 添剤管注 理食塩液 PL 50ml フラッシュ用 解析注射 食食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ンンショット:1日1回	50m L 300m L 70m g /㎡ 250m L		•		
 注射 11 注射 12 注射 12 注射 13 注射 14 注射 14 注射 15 注射 15 注射 15 	議論注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理食塩液 PL 50ml 高高調管注 アリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 PL 50ml 高高連射:1日1回 80 分で 高海管注 アンニットールS注 300mL/袋 高注射:1日1回 80 分で 高層管注 アプラチン注 (70mg/m) 巨理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 高流計:1日1回 レルデム1本終了後 0 分で 電調側管注 理理食塩液 PL 50ml (ソフトバッグ) 高流計:1日1回 レルデム1本終了後 0 分で 電調機管注 リルデム2 を終了を 0 分で 電源調注 1日1回 アンシュット 1日1回 フラッシュ用 原族内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 アンショット:1日1回 (不要の場合は削除)	50m L 300m L 70m g /㎡ 250m L		•	_	
注射	議論注射:1日1回 開 議画的管注 下リアシン注 (30mg/m2) 理母塩液PL 50ml 環滴注射:1日1回 開 裏滴回管注 アンニットールS注 300mL/袋 環滴注射:1日1回 30分で 裏滴注射:1日1回 ルプムプラチン注 (70mg/m) 理母塩液注 250ml (ソフトバッグ) 環滴注射:1日1回 ルゲム上本終了後 0 分で 、減過管注 理食塩液PL 50ml 級滴注射:1日1回 トゲムとを表する の 分で 、減過管注 理食塩液と 250ml (ソフトバッグ) 最高注射:1日1回 トゲムとを表する の 分で 、減過管注 理食塩液と 10ml を表述シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ンシショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	50m L 300m L 70m g /㎡ 250m L		•		
注射 11 / 7 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	議論注射:1日1回 開 議画的管注 下リアシン注 (30mg/m2) 理母塩液PL 50ml 環滴注射:1日1回 開 裏滴回管注 アンニットールS注 300mL/袋 環滴注射:1日1回 30分で 裏滴注射:1日1回 ルプムプラチン注 (70mg/m) 理母塩液注 250ml (ソフトバッグ) 環滴注射:1日1回 ルゲム上本終了後 0 分で 、減過管注 理食塩液PL 50ml 級滴注射:1日1回 トゲムとを表する の 分で 、減過管注 理食塩液と 250ml (ソフトバッグ) 最高注射:1日1回 トゲムとを表する の 分で 、減過管注 理食塩液と 10ml を表述シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ンシショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	50m L 300m L 70m g /㎡ 250m L		•	_	_
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 15 青 注射 16 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 3 点 2 点 4 点 2 点 5 点 2 点 6 点 2 点 6 点 2 点 7 点 2 点 8 点 2 点 9 点 2 点 1 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2	議論注射:1日1回 開 議画の管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理貴塩液PL 50ml 議論注射:1日1回 同問 議論回管注 アンニットールS注 300mL/袋 表演注射:1日1回 30 分で 環論回管注 イスプラチン注 (70mg/m) 理貴塩液注 250ml (ソフトバッグ) 表演注射:1日1回 ハルデム1本終了後 0 分で 1流注射:1日1回 フンニット・ルト記 20ml (ソフトバッグ) 表演注射:1日1回 フラボウンショル 1年間回 フラボウンショル 1年間回 フラボウンショル・:1日1回 フラボウンショル・:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 表演注射・フラッシュ用 (次の場合は削除) フラッシュース 表演注射・フラッシュース のの場合は削除) フラッシュース 表演注射・フラッシュース のの場合は削除) フラッシュース 表演注射・フラッシュース のの場合は削除) フラッシュース のの場合は削除)	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶		•	•	
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 14 点 注射 14 点 注射 15 青 注射 16 点 注射 16 点 注射 16 点 注射 16 点	議論注射:1日1回 開 議画的管注 下ドリアシン注 (30mg/m2) 理費塩液PL 50ml 表滴注射:1日1回 周 周 高温制管注 アンニットールS注 300mL/袋 表滴注射:1日1回 100分で 現論開業注 アスプラチン注 (70mg/m) 理費塩液注 250ml (ソフトバッグ) 混滴注射:1日1回 ルゲム上本終了後 0分で な満層管注 理食塩液 PL 50ml 添注射:1日1回 トゲラッシュ用 手腕内注射:1日1回 「大変の場合は削除) マラッシュ用 手腕の注射:20ml 【要時】ロック付 ンショット:1日1回 (不要の場合は削除) マラッシュ用 高添注射:20ml 【要時】ロック付 シンショッシェル 日本ではできるは を含えるは を含えるは を含えるは を含えるは できると できるは できるな できる できるな できるな できるな できるな できるな できるな できるな できるな できるな できるな できるな で	50m L 300m L 70m g / mf 250m L 1瓶		•		
注射 11 月 2 月 2 月 注射 12 月 注射 13 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 3 月 2 月 3 月 2 月 3 月 3 月 3 月 3 月 3 月 3 月 3 月 4 月 3 月 4 月 3 月 4 月 4 月 5 月 4 月 6 月 4 月 7 月 4 月 8 月 4 月 9 月 4 月 1 月 4 月 1 月 4 月 1 月 4 月 2 月 4 月 2 月 4 月 3 月 4 月 4 月 4 月 4 月 4 月 5 月 4 月 6 月 4 月 7 月 4 月 8 月 4 月 9 月 4 月 1 月 4 月 1 月 4 月 2 月 4 月 2 月 4	議論注射:1日1回 開 調画側管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 主理食塩液 PL 50ml 流流注射:1日1回 と開 高速制管注 アンニットールS注 300mL/袋 流流注射:1日1回 30 分で 流滴性射:1日1回 30 分で 流滴性射:1日1回 ルルデムは本終了後 0 分で 流滴性射:1日1回 ルルデムは本終了後 0 分で 流滴性射:1日1回 バデムは表別と 50ml (ソフトバッグ) 表滴注射:1日1回 バデムは表別と 50ml (ファックリンシュカー 等に変数を PL 50ml 流流注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 等に変数が PL 50ml (不要の場合は削除) フラッシュカー (本質な) リンジ 20ml 【要時】ロック付 アンショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュカー 流流注射:4世界 (大田	50m L 300m L 70m g / mf 250m L 1瓶		•		
注射 11 月 注射 12 月 注射 12 月 注射 13 月 注射 14 月 注射 15 青 注射 16 月 注射 17 月 注射 17 月	議論注射:1日1回 開 深高側管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 流滴注射:1日1回 と開 高の 分で に高側管注 アンニットールS注 300mL/袋 に高減注射:1日1回 30 分で に関食塩液注 250ml (ソフトバッグ) に関食塩液注 250ml (ソフトバッグ) に調食塩液注 151回 クラッシュ用 に高側管注 生理食塩液 PL 50ml に高減注射:1日1回 フラッシュ用 に高減注射:1日1回 フラッシュ用 に高減注射:1日1回 マラッシュ用 に高減注射:1日1回 マラッシュ用 に高減注射:1日1回 マラッシュ用 に高減注射:00ml (平時) マラッシュ用 に高減注射:00ml (平時) マラッシュ用 に高減注射:00ml (平時) ででの場合は削除) アラッシュ用 に高速注射 全食注 (生理食塩液) 100ml (PG) ・ 20ml メイロン84注 、環流注射:1日1回 30ml (PG)	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1简 100m L 20m L		•		
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 点 点 注射 14 点 注射 15 青 注射 16 点 注射 17 点 注射 17 点 注射 17 点	議論注射:1日1回 開 調画側管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 PL 50ml 環滴注射:1日1回 協同 高流注射:1日1回 3.0 分で 高調管注 アンニットールS注 300mL/袋 流流注射:1日1回 (70mg/m) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 流流注射:1日1回 (ルデム1本終了後 0 分で 裏滴側管注 アンニット・1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製練内注射 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除)	50m L 300m L 70m g / mf 250m L 1瓶		•		
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 14 点 注射 15 音 注射 16 点 注射 17 点	議論注射:1日1回 開 深高側管注 アドリアシン注 (30mg/m2) 理貴塩液PL 50ml 混滴回管注 アンニットールS注 300mL/袋 混滴注射:1日1回 30分で 混滴注射:1日1回 ルデム上本終了後 0分で 北海注射:1日1回 ルチム上本終了後 0分で 北海注射:1日1回 ルチム上本終了後 0分で 北海注射:1日1回 トゲーステッシュ用 手腕大注射:1日1回 ラッシュー目 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	50m L 300m L 70m g/㎡ 250m L 1瓶 1前 100m L 20m L		•		
注射 11 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 3 月 2 月 4 月 2 月 4 月 2 月 4 月 2 月 5 月 2 月 6 月 2 月 6 月 2 月 7 月 2 月 6 月 2 月 7 月 2 月 8 月 2 月 8 月 2 月 9 月 2 月 1 日 2 月 1 日 2 月 2 日 2 月 2 日 2 月 2 日 2 月 3 日 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2	議論注射:1日1回 開 調画側管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 PL 50ml 環滴注射:1日1回 協同 高流注射:1日1回 3.0 分で 高調管注 アンニットールS注 300mL/袋 流流注射:1日1回 (70mg/m) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 流流注射:1日1回 (ルデム1本終了後 0 分で 裏滴側管注 アンニット・1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製練内注射 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 製液注射:1日1回 (不要の場合は削除)	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1简 100m L 20m L		•		
注射 11 点 2 点 点 注射 12 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点	議論注射:1日1回 開 高剛管注 下リアシン注 (30mg/m2) 主理食塩液PL 50ml 活剤注射:1日1回 と開 高力と計 でフェットールS注 300mL/袋 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 の 分で 活滴注射:1日1回 の 分で 活滴注射:1日1回 の 分で 活滴注射:1日1回 の // アレールを注 の 分で 活滴注射:1日1回 (アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュール (本達注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ンンショット:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (本達注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ンンショット:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 (本達注)リンジュール (本達注)リンジュール (本達注)は理食塩液)100ml (PG) ・ (本)20ml (PG)	50m L 300m L 70m g/㎡ 250m L 1瓶 1前 100m L 20m L		•		
注射 11 点 2 点 点 注射 12 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点	議論注射:1日1回 開 議画側管注 下リアシン注 (30mg/m2) 理食塩液 PL 50ml 環滴注射:1日1回 同 13高温射:1日1回 100分で 高温調管注 アンニットールS注 300mL/袋 高温注射:1日1回 リカースフラチン注 (70mg/m) 生理食塩液 EL 250ml (ソフトバッグ) に高注射:1日1回 リルデム1本終了後 0分で 高温流計:1日1回 リルテム2 を	50m L 300m L 70m g/㎡ 250m L 1瓶 1前 100m L 20m L		•		
注射 11 点 2 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 12 点 点 注射 13 点 点 注射 14 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点	議論注射:1日1回 開 深調側管注 ドリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 流滴注射:1日1回 30 分で 流滴性射:1日1回 30 分で 流滴性射:1日1回 30 分で 流滴性射:1日1回 30 分で 流滴性射:1日1回 0 分で 流滴性射:1日1回 0 分で 流滴性射:1日1回 0 分で 流滴性射:1日1回 0 分で 流滴性射:1日1回 0 分で 流滴性射:1日1回 7ラッシュ用 高液注射:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 流流注射:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 流流注射:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 流流注射:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 流流注射:1日1回 0 分で 流流注射:1日1回 0 分で (本) 20ml (PG) * 20ml メイロン84注 、流流注射:1日1回 0 分で 高流注射:1日1回 0 分で 高流注射:1日1回	50m L 300m L 70m g/㎡ 250m L 1瓶 1前 100m L 20m L		•	•	•
注射 11 点 2 点 点 注射 12 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点	議論注射:1日1回 開 認識問答注 下リアシン注 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 活滴注射:1日1回 30 分で 添加管注 アンニットールS注 300mL/袋 流流注射:1日1回 30 分で 30 か 30	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1間 100m L 20m L 30m g / m 100m L		•	•	•
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 15 高 注射 16 点 注射 17 点 注射 18 点	議論注射:1日1回 関 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 環滴注射:1日1回 開 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml (30mg/m2) と理食塩液注射:1日1回 (70mg/m1) と理食塩液及PL 50ml (ソフトバッグ) (3流注射:1日1回 (ルデム1本終了後 0 分で (30mg/m2) を食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 フラッシュ用 (30mg/m2) を食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 フラッシュ用 (30mg/m2) (4 定理食塩液) 100ml (PG) (5 で 20ml メイロン84注 (30mg/m2) 生食生(生理食塩液) 100ml (PG) (30mg/m2) 生食塩塩財:1日1回 (30mg/m2) 生食塩塩酸PL 50ml (PG) (30mg/m2) 生理食塩液PL 50ml (PG)	50m L 300m L 70m g/㎡ 250m L 1瓶 1前 100m L 20m L 30m g/㎡ 100m L		•	•	•
注射 11 注射 12 注射 12 注射 13 注射 14 注射 15 注射 16 注射 17 注射 18 2 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 18 2 18 3 18 3 18 3 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 18 4 <	議論注射:1日1回 開 高剛管注 下リアシン注 (30mg/m2) 主理食塩液 PL 50ml 活流注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 00 分で 活滴注射:1日1回 00 分で 活滴注射:1日1回 00 分で 活滴注射:1日1回 00 分で 活滴注射:1日1回 00 分で 活滴注射:1日1回 00 分で 活滴注射:1日1回 00 分で 活滴注射:1日1回 (不要の当品 (不要の場合は削除) 2フッシュ用 等係注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 フンショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 20 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回 30 分で 活滴注射:1日1回	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1間 100m L 20m L 30m g / m 100m L		•	•	•
注射 11 点	議論注射:1日1回 開 深高側管注 下リアシン注 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 流溶性射:1日1回 30 分で 次流注射:1日1回 30 分で 水流対射:1日1回 30 分で 水流対射:1日1回 00 分で 水流注射:1日1回 00 分で 水流注射:1日1回	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1間 100m L 20m L 30m g / m 100m L		•	•	•
注射 11 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 15 高 注射 16 点 注射 17 点 注射 18 点 注射 17 点 注射 17 点 注射 19 点	議論注射:1日1回 間 調画問言注 下リアシン注 (30mg/m2) 理貴塩液PL 50ml 混滴注射:1日1回 30 分で 混滴注射:1日1回 30 分で 混滴注射:1日1回 0 分で 混滴注射:1日1回 0 分で 混滴注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 調流注射:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 (本注:(性理食塩液及 L 50ml (契時) フラッシュ用 (本注:(性理食塩液及) 100ml (PG) (マラッシュ用 (本注:(性理食塩液) 100ml (PG) (マラッシュー (マラッ	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1間 100m L 20m L 30m g / m 100m L		•	•	•
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 15 点 注射 16 点 注射 17 点 注射 18 点 注射 18 点 注射 18 点 注射 19 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 3 点 3 点 4 点 3 点 5 点 3 点 6 点 3 点 7 点 3 点 8 点 3 点 9 点 3 点 1 点 3 点 1 点 3 点 2 点 3 点 2 点 3 点 3 点 3	議論注射:1日1回 開 深高側管注 下リアシン注 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 流溶性射:1日1回 30 分で 次流注射:1日1回 30 分で 水流対射:1日1回 30 分で 水流対射:1日1回 00 分で 水流注射:1日1回 00 分で 水流注射:1日1回	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1間 100m L 20m L 30m g / m 100m L 50m L		•	•	•
注射 11 注射 12 注射 12 注射 13 注射 13 注射 14 注射 15 注射 16 注射 17 注射 17 注射 18 注射 19 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 7 3 8 3 9 4 10 4 10 4 11 4 12 4 13 5 14 4 15 4 16 4 17 4	議議注射:1日1回 間	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1間 100m L 20m L 30m g / m 100m L 50m L		•	•	•
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 点 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 15 高 注射 16 点 支 点 注射 17 点 注射 18 点 注射 19 点 注射 19 点 注射 20 青 注射 20 青 注射 20 青 注射 20 青	議論注射:1日1回 開 調画 語画 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 混滴注射:1日1回 活滴理射:1日1回 活滴注射:1日1回 (30mg/m2) 理食塩液注射:1日1回 (30mg/m2) 理食塩液注射:1日1回 (30mg/m2) 理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) (3流注射:1日1回 (ルデム1本終了後 0 分で (3滴回管注 (イフのg/m) (東理食塩液 PL 50ml (契サ) (東理食塩液 PL 50ml (要時) (不要の場合は削除) フラッシュ用 (表達) (生理食塩液) 100ml (PG) (不要の場合は削除) フラッシュ用 (本達) (生理食塩液) 100ml (PG) (インショット:1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 (本達) (生理食塩液) 100ml (PG) (本) (カール・シール・シール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50m L 300m L 70m g / m ¹ 250m L 1瓶 1简 100m L 20m L 30m g / m ¹ 100m L		•	•	•
注射 11 7 2 4	議論注射:1日1回 開	50m L 300m L 70m g / m 250m L 1瓶 1間 100m L 20m L 30m g / m 100m L 50m L		•	•	•
注射 11 7 注射 12 7 注射 12 7 注射 13 2 注射 14 2 注射 15 6 注射 16 2 水 3 2 注射 17 2 注射 18 2 注射 19 2 注射 20 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 3 6 6 4 6 6 5 7 7 6 7 7 7 8 7 8 8 7 9 9 9 10 10 10 10 1	議論注射:1日1回 開 高調側管注 アリアシン注 (30mg/m2) 理食塩液PL 50ml 活滴注射:1日1回 30 分で 高高側管注 アンニットールS注 300mL/袋 流流注射:1日1回 30 分で 高高側管注 アンニットールS注 300mL/袋 流流注射:1日1回 0 分で 高温側管注 10 分で 高温制:1日1回 アラッシュ用 高流注射:1日1回 アラッシュ用 高注射:1日1回 アラッシュ用 高注射:1日1回 アラッシュ用 高注射:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 高注射:1日1回 (不要の場合は削除) アラッシュ用 高注射:1日1回 0 分で 高温注射:1日1回 0 分で 高温注射:1日1回 1 高温注射:1日1回 2 回り (2 回り) 2 回り (3 回り) 2 回り (4 回り) 3 回り (5 回り) 3 回り (7 回り) 4 回り (7 回り) 4 回り (7 回り) 5 回り (7 回り) 6 回り (7 回り) 7 回り (7 回り) 6 回り (7 回り) 7 回り (7 回り) 7 回り (7 回り) 6 回り (7 回り) 6 回り (7 回り) 7 回り (7 回り)	50m L 300m L 70m g / m ¹ 250m L 1瓶 1简 100m L 20m L 30m g / m ¹ 100m L		•	•	•
注射 11 点 注射 12 点 注射 12 点 注射 13 点 注射 14 点 注射 15 着 注射 16 点 增加 17 点 注射 17 点 注射 18 点 注射 19 点 注射 19 点 注射 19 点 注射 20 着 注射 20 看 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 2 点 3 点 3 点 4 点 3	議論注射:1日1回 開	50m L 300m L 70m g / m ¹ 250m L 1瓶 1简 100m L 20m L 30m g / m ¹ 100m L		•	•	•