

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100 m l（P G）	100m L	
	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6m g	
	ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A	
	ガスター注 20 m g	1 A	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3 点滴注射		●
	トラスツズマブB S注 (初回のみ4mg/kg)	4m g /kg	
	生理食塩液注 250 m l（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 初回：90分。		
注射	4 点滴注射		●
	パクリタキセル注 (80mg/m ²)	80m g /m ²	
	生理食塩液注 250 m l（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60 分で		
注射	5 点滴注射		●
	生理食塩液P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で		
注射	6 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		