

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパミロック) ワンショット：1日1回 不要の場合は削除可	1筒 1筒	●	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) 点滴注射：1日1回 30分	10A 100mL	●	●	●
注射 3	点滴注射 カイプロリス注 70mg/m <sup>2</sup> 、最大154mg/B ★全量250mLに調製★ 注射用蒸留水 100mL (PG) (カイプロリス溶解用) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 30分	70mg/m <sup>2</sup> 1瓶 250mL	●	●	●
注射 4	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	●	●
注射 5	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒	●	●	●
内服	レナデックス	40mg/日 分1-2 食後		day(22)服用	