レジメン名称：I22-301 IsaKd療法 monthly ｻｲｸﾙ2以降（BW≦85）　　休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒						
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ 10mL(ﾍﾞﾐﾛｯｸ)	1筒						
		ワンショット：１日１回							
注射	2	点滴注射		●				●	
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	5Ａ						
		ポララミン注　５ｍｇ／１ｍｌ	1Ａ						
		ガスター注　２０ｍｇ/２ｍＬ	1Ａ						
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ						
		点滴注射：１日１回							
		30　分で							
注射	3	点滴注射		●				●	
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶						
		点滴注射：１日１回							
		30　分以上かけて							
注射	4	点滴注射		●				●	
		サークリサ注	10ｍｇ/kg						
		（10mg/kg）							
		生理食塩液注　２５０ｍｌ（ソフトバッグ）	250ｍＬ						
		【全量250mLに調製】							
		点滴注射：１日１回							
		初回：最初60分；50mL/h。							
		以降、30分毎に10mL/hずつ上げ100mL/hまで。							
		2回目以降：最初60分；50mL/h。							
		次30分；80mL/h、以降；110ml/hまで。							
		インラインフィルターを使用。							
注射	5	点滴注射		●				●	
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶						
		点滴注射：１日１回							
		サークリサフラッシュ用							
注射	6	点滴注射		●					
		カイプロリス注	56ｍｇ/㎡						
		（56mg/㎡）							
		注射用蒸留水　１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶						
		（カイプロリス溶解用）							
		５％ブドウ糖注　１００ｍｌ	100ｍＬ						
		点滴注射：１日１回							
		30分で							
注射	7	点滴注射		●					
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶						
		点滴注射：１日１回							
		カイプロリスフラッシュ用							
注射	8	点滴注射			●	●	●		●
		デキサート注　３．３ｍｇ／１ｍｌ	5Ａ						
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ						
		点滴注射：１日１回							
		30　分で							
注射	9	点滴注射			●	●	●	●	●
		カイプロリス注	56ｍｇ/㎡						
		（56mg/㎡）							
		注射用蒸留水　１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶						
		（カイプロリス溶解用）							
		５％ブドウ糖注　１００ｍｌ	100ｍＬ						
		点滴注射：１日１回							
		30分で							
注射	10	点滴注射			●	●	●	●	●
		生理食塩液ＰＬ　５０ｍｌ	1瓶						
		点滴注射：１日１回							
		カイプロリスフラッシュ用							
内服									
		レナデックス	20mg/日		day(22)(23)服用				
			分1 食後						