

レジメン名称：T20-401 mFOLFOX6+Tmab biweekly（1c目）

休薬期間：14日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合削除）	1筒 1筒	●
注射	2	点滴注射（リザーバーより） プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 30分で 点滴注射：1日1回	150mg 100mL	●
注射	3	点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg / 1mL アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 15分で	6.6mg 1袋	●
注射	4	点滴注射(リザーバーより) トラスツズマブBS注 （初回のみ6mg/kg） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回 90分	6mg/kg 250mL	●
注射	5	点滴注射（リザーバーより） レボホリナート注 （200mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 120分で	200mg/m ² 250mL	●
注射	6	点滴注射(リザーバーより) エルブラット注 （85mg/m ² ） 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で	85mg/m ² 250mL	●
注射	7	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 （400mg/m ² ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 4分で	400mg/m ² 50mL	●
注射	8	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用。	1瓶	●
注射	9	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合削除） フラッシュ用	1筒	●
注射	10	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 （2400mg/m ² ） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） （全量140mLに調製） 点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で	2400mg/m ² 1瓶	●