

レジメン名称：T20-201 Tmab/Eribulin (d1,8) triweekly 2コース目以降 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	
		トラスツズマブBS注	6mg/kg		
		（2回目以降6mg/kg）			
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
		点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。			
注射	4	点滴注射		●	●
		ハラヴェン注	1.4mg/m ²		
		（1.4mg/m ² ）			
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 5分で			
注射	5	点滴注射		●	●
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	6	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）			