

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) | day(8) |
|--------|--|------------------------------|--------|--------|
| 注射 1 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリン) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | 1筒 1筒 | ● | ● |
| 注射 2 | 点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 点滴注射：1日1回 30分 | 6.6mg 100mL | ● | |
| 注射 3 | 点滴注射 ジェムザール注 (800mg/m ²) 5%ブドウ糖注 100ml 点滴注射：1日1回 30分 | 800mg/m ² 1瓶 | ● | |
| 注射 4 | 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分 | 1瓶 | ● | |
| 注射 5 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除) | 1筒 | ● | |
| 注射 6 | 点滴注射 デキサート注 3. 3mg / 1ml アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL 点滴注射：1日1回 30分 | 6.6mg 1袋 | | ● |
| 注射 7 | 点滴注射 ドセタキセル注 (60-70mg/m ²) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 60分 | 70mg/m ² 250mL | | ● |
| 注射 8 | 点滴注射 ジェムザール注 (800mg/m ²) 5%ブドウ糖注 100ml 点滴注射：1日1回 30分 | 800mg/m ² 1瓶 | | ● |
| 注射 9 | 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分 | 1瓶 | | ● |
| 注射 10 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除) | 1筒 | | ● |