

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ペリナドール用100単位/mLシリンジ 10mL(ペミロック)	1筒		
	ワンショット: 1日1回			
	リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射 (リザーバーより)		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6g		
	ボラミン注 5mg/1mL	1A		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射: 1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	アーピタックス注 (初回のみ400mg/m <sup>2</sup> )	400mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注【生食】 500mL	500mL		
	点滴注射: 1日1回 初回: 120分			
注射 4	点滴注射 (リザーバーより)		●	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶		
	点滴注射: 1日1回 15分で			
注射 5	点滴注射 (リザーバーより)		●	
	レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	200mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射: 1日1回 120分で			
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●	
	カンプト注 (150-180mg/m <sup>2</sup> )	150mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射: 1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90分で			
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射: 1日1回 レボホリナート終了後全開 4分で			
注射 8	点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射: 1日1回 フラッシュ用			
注射 9	静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット: 1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射 10	点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注 (2400mg/m <sup>2</sup> )	2400mg/m <sup>2</sup>		
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG) (全量140mLに調製)	1瓶		
	点滴注射: 1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で			
注射 11	点滴注射 (リザーバーより)			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6g		
	ボラミン注 5mg/1mL	1A		
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射: 1日1回 30分で			
注射 12	点滴注射			●
	アーピタックス注 (250mg/m <sup>2</sup> )	250mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射: 1日1回 60分で			
注射 13	点滴注射 (リザーバーより)			●
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶		
	点滴注射: 1日1回 15分で			
注射 14	静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット: 1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			