

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒				
		ヘパリンNa液用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリック)	1筒				
		(不要の場合は削除)					
		ワンショット：1日1回					
注射	2	点滴注射		●	●	●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg				
		ボララミン注 5mg/1mL	1A				
		ガスター注 20mg	1A				
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL				
		点滴注射：1日1回					
		30分で					
注射	3	点滴注射		●			
		アービタックス注	400mg/m ²				
		(初回のみ400mg/m ²)					
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL				
		点滴注射：1日1回					
		120分で					
注射	4	点滴注射		●			
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		15分で					
注射	5	点滴注射		●			
		パクリタキセル注	80mg/m ²				
		(80mg/m ²)					
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL				
		点滴注射：1日1回					
		インラインフィルターを使用					
		60分で					
注射	6	点滴注射		●			
		生理食塩液PL 50mL	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		フラッシュ用					
注射	7	静脈内注射		●			
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒				
		ワンショット：1日1回					
		(不要の場合は削除)					
		フラッシュ用					
注射	8	点滴注射			●	●	
		アービタックス注	250mg/m ²				
		(250mg/m ²)					
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL				
		点滴注射：1日1回					
		60分で					
注射	9	点滴注射			●	●	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		15分で					
注射	10	点滴注射			●	●	
		パクリタキセル注	80mg/m ²				
		(80mg/m ²)					
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL				
		点滴注射：1日1回					
		インラインフィルターを使用					
		60分で					
注射	11	点滴注射			●	●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		フラッシュ用					
注射	12	静脈内注射			●	●	
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒				
		ワンショット：1日1回					
		(不要の場合は削除)					
		フラッシュ用					
注射	13	点滴注射					●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg				
		ボララミン注 5mg/1mL	1A				
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL				
		点滴注射：1日1回					
		30分で					
注射	14	点滴注射					●
		アービタックス注	250mg/m ²				
		(250mg/m ²)					
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL				
		点滴注射：1日1回					
		60分で					
注射	15	点滴注射					●
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		15分で					
注射	16	静脈内注射					●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒				
		ワンショット：1日1回					
		(不要の場合は削除)					
		フラッシュ用					