

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)	day(15)
注射	1	点滴注射		●			●	●
		ボララミン注 5 m g／1 m l	1 A					
		生理食塩液 P L 5 0 m l	50m L					
		点滴注射：1日1回						
		30 分で						
注射	2	点滴注射		●			●	●
		ガザイバ注	1000m g					
		(1000mg/body)						
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L					
		(全量250mlに調製)						
		インラインフィルター使用						
		点滴注射：1日1回						
		初回12.5mL/hで開始。30分毎に12.5mL/hずつ上げ						
		100mL/hまで。2回目以降30mL/hで開始。30						
		分毎に25mL/hずつ上げ100mL/hまで。						
		4.5h、2回目以降3.5h。						
注射	3	点滴注射		●				
		生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶					
		点滴注射：1日1回						
		フラッシュ用						
注射	4	点滴注射		●				
		生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L					
		点滴注射：1日1回						
		8-12時間						
注射	5	点滴注射		●				
		生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L					
		点滴注射：1日1回						
		8-12時間						
注射	6	点滴注射			●			
		デキサート注 3 . 3 m g／1 m l	6.6m g					
		アロキシ注バッグ 0 . 7 5 m g／5 0 m L	1袋					
		点滴注射：1日1回						
		30 分で						
注射	7	点滴注射			●			
		トレアキシン注	90m g /㎡					
		(90m g /m2)						
		生理食塩液 P L 5 0 m l	50m L					
		点滴注射：1日1回						
		10 分で						
注射	8	点滴注射			●			
		生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶					
		点滴注射：1日1回						
		フラッシュ用						
注射	9	点滴注射			●			
		生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L					
		点滴注射：1日1回						
		8-12時間						
注射	10	点滴注射			●			
		生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L					
		点滴注射：1日1回						
		8-12時間						
注射	11	点滴注射				●		
		デキサート注 3 . 3 m g／1 m l	6.6m g					
		生食注（生理食塩液）1 0 0 m l (P G)	100m L					
		点滴注射：1日1回						
		30 分で						
注射	12	点滴注射				●		
		トレアキシン注	90m g /㎡					
		(90m g /m2)						
		生理食塩液 P L 5 0 m l	50m L					
		点滴注射：1日1回						
		10 分で						
注射	13	点滴注射				●	●	●
		生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶					
		点滴注射：1日1回						
		フラッシュ用						
注射	14	点滴注射				●		
		生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L					
		点滴注射：1日1回						
		8-12時間						
注射	15	点滴注射				●		
		生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L					
		点滴注射：1日1回						
		8-12時間						
注射	16	静脈内注射				●	●	●
		生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】ロック付	1筒					
		ワンショット：1日1回						
		(不要の場合は削除)						
		フラッシュ用						
注射	17	静脈内注射				●	●	●
		生食注シリンジ 2 0 m l ロック付	1筒					
		ペ リンNa0.9%用100単位/mLシリンジ 10mL(ペ ミック)	1筒					
		ワンショット：1日1回						
		(不要の場合は削除)						