

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ベリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ベミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL ポララミン注 5mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1A 100mL	●	●	
注射 3	点滴注射 サイラムザ注 （8mg/kg） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 （全量250mLに調製） インラインフィルターを使用 初回60分で投与。忍容性が良好であれば、 2回目以降30分で投与。	8mg/kg 250mL	●	●	
注射 4	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 サイラムザ投与後フラッシュ用	1瓶	●	●	
注射 5	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前、投与後フラッシュ用 サイラムザと別ルート使用	1瓶	●		
注射 6	点滴注射 アブラキサン注 （100mg/m <sup>2</sup> ） 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/m <sup>2</sup> 50mL	●		
注射 7	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●		
注射 8	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL		●	
注射 9	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前、投与後フラッシュ用 サイラムザと別ルート使用	1瓶		●	●
注射 10	点滴注射 アブラキサン注 （100mg/m <sup>2</sup> ） 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/m <sup>2</sup> 50mL		●	●
注射 11	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●	●