

休薬期間：21日

休薬期間：21日

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒	●
注射 2	点滴注射 ソルデム3A注 500m l 点滴注射：1日1回 90 分で	500m L	●
注射 3	点滴注射 ヴィーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 90 分で	500m L	●
注射 4	点滴注射 ヴィーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 60 分で	500m L	●
注射 5	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1m l アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30 分で	9.9mg 1袋	●
注射 6	点滴側管注 アバスチン注 (15mg/kg) 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 30 分で	15mg/g 100m L	●
注射 7	点滴側管注 アリムタ注射用 (500mg/m2) 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 10 分で	500mg/g/m ² 100m L	●
注射 8	点滴側管注 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 30 分で	100m L	●
注射 9	点滴側管注 マンニトールS注 300m l 点滴注射：1日1回 30 分で	300m L	●
注射 10	点滴側管注 シスプラチン注 (75mg/m ²) 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で	75mg/g/m ² 250m L	●
注射 11	点滴側管注 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 12	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●